



**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

“COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES DE LAS PACIENTES CON  
DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO PROLONGADO EN EL HOSPITAL MARÍA  
AUXILIADORA, 2013-2014”

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN  
OBSTETRICIA

Presentado por:

**Bachiller:** SOLANO MERMA, CINTHIA LUZ

**LIMA – PERÚ**

**2015**

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar las Complicaciones Maternas y Perinatales de las Pacientes con Diagnóstico de Embarazo Prolongado en el Hospital María Auxiliadora. Lima, 2013-2014

**MATERIAL Y METODO:** Observacional, retrospectivo de casos y controles. Se estudió 612 gestantes, casos: 204 con embarazo de 42 semanas a más y controles: 408 con embarazo  $\geq 37$  semanas y menor de 42 semanas.

**RESULTADOS:** Se encontró que el 66.7% tuvo edad materna de 20-34 años, 45.1% nuliparidad, 76.5% inicio del trabajo de parto fue espontáneo y 60.8% término el trabajo de parto por cesárea. La corioamnionitis fue la complicación materna con mayor frecuencia 16.9% ( $\chi^2=6.02$ ,  $p>0.05$ , OR=1.84; IC:[1.12-3.01]), seguido el desgarro perineal 10.3% ( $\chi^2=2.17$ ,  $p>0.05$ , OR=1.56; IC:[0.86-2.82]), oligohidramnio 5.9% ( $\chi^2=1.19$ ,  $p>0.05$ , OR=1.53; IC:[0.71-3.30]), hemorragia postparto 3% ( $\chi^2=8.7$ ,  $p<0.05$ , OR=12.33; IC:[1.47-103.14]), endometritis 2.1% ( $\chi^2=1.8$ ,  $p>0.05$ , OR=2.70; IC:[0.60-12.18]) y la muerte materna 1.4% ( $\chi^2=3.14$ ,  $p>0.05$ , OR=6.07; IC:[0.63-58.77]). La complicación perinatal con mayor frecuencia fue macrosomía 21.6% ( $\chi^2=12.15$ ,  $p<0.05$ , OR=2.28; IC:[1.39-3.76]), seguido el sufrimiento fetal 17.6% ( $\chi^2=10.90$ ,  $p>0.05$ , OR=2.28; IC:[1.39-3.76]), asfixia 17.6% ( $\chi^2=65.19$ ,  $p<0.05$ , OR=28.93; IC:[8.79-95.23]), síndrome de aspiración meconial 42% ( $\chi^2=6.17$ ,  $p<0.05$ , OR=3.72; IC:[1.23-11.25]), distocia de hombros 2.1% ( $\chi^2=1.80$ ,  $p>0.05$ , OR=2.70; IC:[0.60-12.18]), el RCIU 1.2% ( $\chi^2=4.0$ ,  $p<0.05$ ) y muerte perinatal 1.2% ( $\chi^2=0.25$ ,  $p>0.05$ , (OR=2.70; IC:[0.60-12.18])).

**CONCLUSIÓN:** Las complicaciones maternas y perinatales en pacientes con embarazo prolongado fueron mayores que en aquellas que no presentaron estas patologías.

**PALABRAS CLAVES:** Embarazo Prolongado, Características y Complicaciones Maternas y Perinatales.