



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE LA SÍFILIS EN
LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DEL
PROGRAMA DE CONTROL DE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL (PROCITS) DEL HOSPITAL SAN JUAN
DE LURIGANCHO, 2014.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
OBSTETRICIA**

Presentado por:

Bachiller: BAZAN CUBA, KARINA ROCIO

LIMA – PERÚ

2015

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores de riesgo de la sífilis en los pacientes que acuden al servicio de programa de control de infecciones de transmisión sexual (PROCITS) del Hospital San Juan de Lurigancho, 2014.

Materiales y Método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se usó el universo de la población que fueron los pacientes que acuden al consultorio de PROCITS durante el periodo de un año (del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014), siendo un total de 81 pacientes diagnosticados con sífilis.

Resultados: En las características sociodemográficas, el sexo masculino fue de mayor prevalencia con 51%, la edad más común fue de 19 a 25 años en un 29,2%, la paridad fue de 4 en un 68%, el grado de instrucción fue con estudios en un 86 %, el estado civil fue casado con 89% y el 51% tenía trabajo. La prevalencia de sífilis predominó en la etapa joven con 49% y en el género femenino con 51%. Finalmente, los factores de riesgo de mayor prevalencia fueron las ITS en un 43% en jóvenes 18.5% de sexo femenino 27.7%.

Conclusión: La prevalencia de sífilis se dio en los jóvenes de género femenino. Los factores de riesgo fueron los antecedentes de ITS y el contacto con secreciones se dio en jóvenes de género femenino. Los antecedentes de drogadicción y antecedentes de múltiples parejas sexuales se dieron con mayor prevalencia en los jóvenes de género masculino. Finalmente los antecedentes de transfusiones se dieron en los adultos mayores de género femenino.

Palabras claves: Prevalencia. Factores de Riesgo. Sífilis.