



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA

**“PREVALENCIA DE LESIONES PRECURSORAS DE CANCER CERVICOUTERINO
Y FACTORES DE RIESGO EN LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE
SALUD ALBERTO BARTON EN EL AÑO 2011”**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA
EN LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

PRESENTADO POR:

Bachiller: ZEGARRA UCHIRI, CHRISTIAN GIOVANNI

LIMA – PERÚ

2015

RESUMEN

Este estudio se realizó con el objetivo de dar a conocer la prevalencia de lesiones precursoras de cáncer cervical en la población de mujeres que se atendieron en el centro de salud Alberto Barton- Callao en el año 2011, relacionando estos hallazgos con los factores de riesgo que podrían estar presentes. Se revisaron los resultados de Papanicolaou de 809 mujeres comprendidas entre los 15 a 71 años de edad. Dentro de la muestra se encontró 51 casos de citologías anormales; entre los cuales hay 16 con ASCUS, 12 con LIBG por PVH, 19 con displasia leve (NIC I), 3 con displasia moderada (NIC II) y 1 caso con displasia severa (NIC III). Entre los factores de riesgo un 70.2% iniciaron las relaciones sexuales antes de los 18 años, el 81.2% tuvieron más de 3 compañeros sexuales, 11.4% tienen de 5 a más embarazos, 36.5% planificaron con anovulatorio o DIU y el 78.5% su última citología fue de 3 años a más o nunca. De otro lado el 39.9% presentaron agentes infecciosos. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS.

Se concluye que la prevalencia de lesiones precursoras de cáncer cervical es 6.3%, entre los factores de riesgo asociados se encontró que el número de compañeros sexuales fue estadísticamente significativo. Se recomienda plantear nuevos estudios que aborden otros factores de riesgo y fomentar el programa de detección oportuna de cáncer cervicouterino.