



UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**“CLAMPAJE TARDIO DEL CORDON UMBILICAL Y LA
CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA EN EL RECIEN NACIDO
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA MAYO - JUNIO 2014”**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA

Presentado por:

Bachiller: ARROYO FERNANDEZ, MILAGRITOS AVELINDA.

LIMA – PERÚ

2015

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el clampaje tardío del cordón umbilical y la concentración de hemoglobina en el recién nacido.

Materiales y Método: Se realizó un estudio tipo analítico, comparativo, de corte transversal en el Hospital María Auxiliadora, Mayo–Junio 2014. Se aplicó la prueba de Chi cuadrado y se realizó el análisis de regresión logística de las variables de estudio.

Resultados:

Del total de partos evaluados que ingresaron a la investigación el 48.3% correspondieron a clampaje precoz y el 51.7% con clampaje tardío.

El promedio de hemoglobina para los pacientes con clampaje precoz fue de 12.1 mg/dl y para los pacientes con clampaje tardío fue de 18.2 mg/dl, es decir se observa una diferencia de 6.1 mg/dl a favor del clampaje tardío.

Se observó asociación entre el clampaje tardío y la mayor concentración de hemoglobina, lo que comprueba la hipótesis de que el clampaje tardío contribuye a una mayor concentración de hemoglobina.

Conclusión:

La concentración de hemoglobina en el recién nacido con clampaje tardío del cordón umbilical es mayor que en clampaje precoz.

Palabras claves:

Clampaje tardío, cordón umbilical, hemoglobina