



**FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE FARMACIA
Y BIOQUÍMICA**

Conocimientos y prácticas sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia
(AOE) en estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Norbert Wiener, agosto-diciembre 2014

**TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
DE QUÍMICO FARMACÉUTICO**

Presentada por

Merino Revilla, Karla Norma
Machaca Rocha, Sandra Beatriz

Asesor

Mg. MC. QF. Víctor Crispín Pérez

Lima-Perú

2015

DEDICATORIA

A Dios, por darnos la oportunidad de vivir y por estar con nosotros en cada paso,
por fortalecer nuestro corazón e iluminar nuestra mente.

A nuestros amados padres, por su inmenso amor y por su incondicional apoyo
perfectamente mantenido a través del tiempo.

A nuestros familiares y amigos(as), por la confianza depositada en nosotros.

Y por haber puesto en nuestro camino al doctor Víctor Crispín Pérez,
que ha sido nuestro asesor durante todo este periodo.

AGRADECIMIENTOS

Al doctor Víctor Crispín Pérez, por su apoyo y paciencia para lograr la culminación de esta meta tan importante.

A LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER

Por habernos formado como grandes profesionales durante el que estuvimos en las aulas, dándonos las herramientas para poder forjarnos un gran futuro.

A LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

Por darnos profesores de calidad, que nos motivaron a la investigación y, de esta manera, a hacer un pequeño aporte a la salud de nuestro país.

ÍNDICE

	Pág.
I. EL PROBLEMA	
1.1. Planteamiento del problema	12
1.2. Formulación del problema	17
1.3. Objetivos	19
1.4. Justificación	19
1.5. Alcances y limitaciones	20
1.6. Variables	21
II. MARCO TEÓRICO	
2.1. Teorías generales	22
2.2. Base teórica	30
2.3. Identificación y operacionalización de variables	46
2.4. Operacionalización de variables	46
2.5. Hipótesis	47
III. DISEÑO METODOLÓGICO	
3.1. Tipo de estudio	48
3.2. Población	48
3.3. Descripción del área geográfica del estudio	48
3.4. Representación gráfica del estudio	48
3.5 Muestra	48
3.6. Técnicas de investigación	50

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
4.1 Resultados	51
4.2 Discusión	73
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
5.1. Conclusiones	77
5.2. Recomendaciones	79
Referencias bibliográficas	80
Anexos	88

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1	51
Tabla 2	52
Tabla 3	53
Tabla 4	54
Tabla 5	55
Tabla 6	56
Tabla 7	57
Tabla 8	58
Tabla 9	59
Tabla 10	60
Tabla 11	61
Tabla 12	62
Tabla 13	63
Tabla 14	64
Tabla 15	65
Tabla 16	66
Tabla 17	67
Tabla 18	68
Tabla 19	69
Tabla 20	70
Tabla 21	71
Tabla 22	72

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico 1	51
Gráfico 2	52
Gráfico 3	53
Gráfico 4	54
Gráfico 5	55
Gráfico 6	56
Gráfico 7	57
Gráfico 8	58
Gráfico 9	59
Gráfico 10	60
Gráfico 11	61
Gráfico 12	62
Gráfico 13	63
Gráfico 14	64
Gráfico 15	65
Gráfico 16	66
Gráfico 17	67
Gráfico 18	68
Gráfico 19	69
Gráfico 20	70
Gráfico 21	71
Gráfico 22	72

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos y prácticas sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en estudiantes del tercer al décimo ciclo del turno noche de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Norbert Wiener. Se llevó a cabo entre los meses de agosto y diciembre del año 2014. El estudio fue observacional, descriptivo y transversal, en una población de 284 estudiantes. Para cumplir con los objetivos de la investigación se realizó una encuesta a una muestra de 166 estudiantes. En los resultados se observó que 112 (67,47 %) pertenecían al sexo femenino, y 54 (32,53 %) al sexo masculino. Las edades estuvieron comprendidas en un rango de 20 a 50 años; 123 (74,10 %) de los estudiantes eran solteros, 42 (25,30 %) casados y 1 (0,6 %) divorciados. En cuanto a los conocimientos sobre el mecanismo de acción del AOE, 123 (74,2 %) de los estudiantes encuestados tuvieron un nivel malo, 116 (69,88 %) alcanzaron un nivel bueno en cuanto a los efectos secundarios que produce el AOE, 151 (90,96 %) obtuvieron un nivel bueno sobre el tiempo pos relación sexual sin protección para usar el AOE (72 horas). En cuanto a las prácticas sobre el uso del AOE, se tuvo que 166 (100 %) de los estudiantes encuestados indicaron haber utilizado el AOE, y tuvieron un nivel de prácticas adecuadas en cuanto a las razones de uso del AOE, 150 (90,36 %) de los estudiantes encuestados indicaron utilizar un método anticonceptivo regular o diferente después de haber usado el AOE; por ello, alcanzaron un nivel de prácticas adecuadas. En lo que respecta a las principales razones de uso frecuente del AOE en los estudiantes, se obtuvo que les resultó más fácil acudir a una botica o farmacia y adquirirlo más rápido. Esto también era debido a la falta de tiempo y porque no contaban con dinero para la consulta médica; por ello, 142 (85,54 %) de los estudiantes encuestados indicaron haber usado el AOE sin prescripción médica, alcanzando un nivel de prácticas inadecuadas.

Palabras clave: anticonceptivo oral de emergencia (AOE), nivel de conocimientos, nivel de prácticas.

SUMMARY

This study aimed to determine the level of knowledge and practices on the use of oral emergency contraceptive (AOE) in students from third to tenth shift night cycle of the Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University Norbert Wiener, took out between August and December 2014. The study was observational, descriptive and cross, in a population of 284 students.

To meet the objectives of the research a survey was conducted on a sample of 166 students.

In the results it was observed that 112 (67.47 %) were female and 54 (32.53 %) were males, ages were included in a range of 20 to 50 years, 123 (74.10 %) of the students were single, 42 (25.30 %) married and 1 (0.6 %) divorced.

As for the knowledge of the mechanism of action of ECPs, 123 (74.2 %) of the students surveyed had a bad level, 116 (69.88 %) of the students reached a good level in terms of side effects produced by AOE, 151 (90.96 %) of the students achieved a good level over time after unprotected intercourse to use the AOE (72 hours).

As for the practices on the use of AOE, we had 166 (100 %) of the students surveyed said they had used the AOE, and had a level of good practice regarding the reasons of use of AOE, 150 (90.36 %) of the students surveyed said they use a regular or different type of contraception after using the AOE, so they reached a level of good practice.

With regard to the main reasons for frequent use of emergency oral contraception (AOE) in students, it was found that they found it easier to go to a drugstore or pharmacy and buy it faster, this was also due to lack of time and because they had no money for medical consultation, so 142 (85.54 %) of the students surveyed said they had used the AOE without a prescription, reaching a level of inappropriate practices.

Keywords: oral contraceptive of emergency (AOE), level of knowledge, practices level.